

tetesept:



Bronchosan® Husten Akut Lutschtabletten

UVP*: 3.49 EUR
Stand: 12.6.2026

Das Wichtigste in Kürze:

- Befreiung der oberen Atemwege von Reizungen.
- Schutz und Regeneration der Schleimhäute.
- Natürliche Beruhigung akuter Reizhusten-Attacken.
- Mit Wirk-Kern
- Auch für Kinder ab 6 Jahren
- Ideal für unterwegs

Eigenschaften:

tetesept Bronchosan® Husten Akut Lutschtabletten wirken bei trockenem Erkältungshusten und bei allen Arten von Hals- und Rachenreizungen. Sie lindern Reizungen der oberen Atemwege sofort und beruhigen gereizte Schleimhäute in Hals und Rachen effektiv.

tetesept Bronchosan® Husten Akut Lutschtabletten enthalten konzentrierten Eibischextrakt. Eibisch legt sich langanhaltend auf die gereizten Schleimhäute, bildet dort einen natürlich wirksamen Schutzfilm und entfaltet seine lindernde Wirkung. Die Schleimhäute werden gezielt beruhigt und können regenerieren. Akute Reizhusten-Attacken lassen spürbar nach.

Die balsamartige Füllung des Wirk-Kerns mit Eibisch stärkt zusätzlich den natürlich wirksamen Schutzfilm. Die Lutschtabletten haben einen aromatischen Geschmack nach Honig und Eukalyptus. Eukalyptus sorgt für ein erfrischendes

Erlebnis in Hals und Rachen.

Die 3-in-1 Wirkung der tetesept Bronchosan® Husten Akut Lutschtabletten beruhigt und lindert schnell trockenen Erkältungshusten und akute Husten-Attacken:

1. Befreiung der oberen Atemwege von Reizungen.
2. Schutz und Regeneration der Schleimhäute.
3. Natürliche Beruhigung akuter Reizhusten-Attacken.

Anwendung & Hinweise:

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, lassen Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren bis zu 6 Lutschtabletten täglich im Mund zergehen.

Damit die Inhaltsstoffe jeder einzelnen Lutschtablette möglichst lange im Mund und Rachen einwirken können, lösen sich tetesept Bronchosan® Husten Akut Lutschtabletten sehr langsam auf. Sie sind jederzeit – auch unterwegs bequem anzuwenden.

Bei Bedarf können tetesept Bronchosan® Husten Akut Lutschtabletten auch über einen Zeitraum von bis zu 30 Tagen angewendet werden. Wenn sich die Beschwerden nach einer Woche nicht ge bessert oder sogar verschlechtert haben, sollten Sie bitte einen Arzt aufsuchen.

Hinweise zur Anwendung und Aufbewahrung:

Das Verfallsdatum dieses Medizinprodukts ist auf dem Umkarton und den Blisterstreifen aufgedruckt.

Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach diesem Datum! Nicht über 25°C und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Wichtige Information für Diabetiker:

1 Lutschtablette enthält 2,5 g Isomaltitol und Maltitol. Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen. Der Kalorienwert beträgt 2,3 kcal/g.

tetesept Bronchosan® Husten Akut Lutschtabletten dürfen nicht angewendet werden:

- bei Kindern unter 6 Jahren,
- bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Isomalt, Menthol, Eukalyptusöl, Malitiol, Sojalecithin, Soja, Erdnuss oder einem der in der Zusammensetzung genannten Bestandteile.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:

tetesept Bronchosan® Husten Akut Lutschtabletten enthält 7,5 mg Propylenglycol pro Lutschtablette, Sorbitol, Maltitol und Isomalt. Bitte nehmen Sie das Produkt erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

tetesept Bronchosan® Husten Akut Lutschtabletten enthält 1,34 mg Alkohol (Ethanol) pro Lutschtablette. Diese Menge entspricht weniger als 0,02 ml Bier oder Wein und hat daher keine spürbare Auswirkung auf den Anwender. Das Produkt enthält 20 mg Sorbitol pro Lutschtablette. Sorbitol ist eine Fructozuckerquelle. Wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie (oder Ihr Kind) unter einer Unverträglichkeit gegen über bestimmten Zuckern leiden oder wenn bei Ihnen eine hereditäre Fructoseintoleranz (HFI) diagnostiziert wurde, eine seltene genetische Störung, bei der eine Person Fructose nicht abbauen kann, sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie (oder Ihr Kind) dieses Produkt einnehmen oder erhalten.

Wenn während der Einnahme des Medizinprodukts Atemnot, Fieber oder eitriger Auswurf auftreten, sollte ein Arzt zu Rate gezogen werden. Die Absorption gleichzeitig verabreichter Medikamente kann verzögert sein. Als Vorsichtsmaßnahme sollte das Produkt nicht eine halbe bis eine Stunde vor oder nach der Einnahme anderer Produkte eingenommen werden.

Wenn sich die Symptome während der Einnahme des Medizinprodukts verschlimmern, sollte ein Arzt konsultiert werden.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Zur Anwendung dieses Medizinproduktes in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Daher sollte die Anwendung von tetesept Bronchosan® Husten Akut Lutschtabletten in der Schwangerschaft und

Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt oder Apotheker erfolgen.

Nebenwirkungen:

Isomalt und Maltitol können leicht abführend wirken. Dieser Effekt tritt bei Überdosierung verstärkt auf. Sehr selten kann Sojalecithin allergische Reaktionen hervorrufen. Bei sensibilisierten Patienten kann tetesept Bronchosan®Husten Akut Lutschtabletten Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Atemnot) hervorrufen.

Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden: z. B:

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abteilung Medizinprodukte
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
D-53175 Bonn
<http://www.bfarm.de>

Wechselwirkungen:

Derzeit sind keine Wechselwirkungen mit anderen Mitteln bekannt.

Zusammensetzung:

Eibischwurzel-Extrakt (87,5 mg/Lutschpastille), Isomalt flüssig, Zitronensäure, Menthol, natürliches Honigaroma, Honigaroma NI, natürliches Aroma Kräuter, Sucralose, Wasser, Maltitol Sirup, Thymian Extrakt, Spitzwegerich-Extrakt, Glycerol, Eukalyptusöl, Soja-Lecithin.

Handelsform:

20 Lutschtabletten

GTIN:

4008491115933

PZN: